

Pecile M., Zavaglia C., Ciardi A.

Cabernet Cortis

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nome: Cabernet Cortis N.

Codice: 466

Sinonimi ufficiali:

Annotazioni: Uve non utilizzabili per i vini a denominazione di origine ex art. 8, comma 6, decreto legislativo n. 61/2010

Data di ammissione: 10/07/2013, decreto pubblicato sulla G. U. 186 del 9/08/2013

2. INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni presentate in questa sezione sono tratte da: - Estratto dalla domanda di iscrizione della varietà al Registro Nazionale presso il MIPAAF

2.1. Descrizione Ampelografica

Il vitigno Cabernet Cortis n. venne ottenuto nel 1982 da Norbert Beker a Freiburg incrociando Cabernet sauvignon x Solaris ed è riconosciuta come varietà resistente alle principali malattie funginee.

Germoglio

001 - Apertura dell'apice - 5) completamente aperto

003 - Intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice - 5) media

004 - Densità dei peli striscianti dell'apice - 7) elevata

Foglia giovane

051 - Colore della pagina superiore del lembo (IV foglia) - 4) ramato

Foglia adulta

065 - Dimensione del lembo - 5/7) medio/grande

068 - Numero dei lobi - 3) cinque

070 - Distribuzione della pigmentazione antocianica sulle nervature principali della pagina superiore del lembo - 1) assente

075 - Bollosità della pagina superiore del lembo - 5/7) media/forte

079 - Grado di apertura/sovrapposizione dei bordi del seno peziolare - 7) mediamente sovrapposto

Tralcio legnoso

103 - Colore prevalente - 2) brunastro

Grappolo

204 - Compattezza - 3/5) spargolo/medio

Acino

220 - Lunghezza - 3/5) da piccolo a medio

223 - Forma - 3) ellittico largo

225 - Colore della buccia - 6) blu nero

231 - Intensità della pigmentazione antocianica della polpa - 1) nulla o molto debole

233 - Rendimento in succo - 5/7) da medio ad alto

236 - Sapore particolare - 5) aroma diverso da moscato/foxy/erbaceo

2.2. Fenologia

301 - Epoca di germogliamento - 5) media

302 - Epoca di fioritura - 3/5) precoce/media

304 - Epoca di maturazione fisiologica dell'acino - 3) precoce

351 - Vigoria del germoglio - 5/7) media/elevata

Dati produttivi e Caratteri tecnologici

504 - Resa in uva - 3/5) da basso a medio

505 - Tenore in zucchero del mosto - 5) medio

506 - Acidità totale del mosto - 5) media

2.3. Caratteristiche ed Attitudini culturali

452 - Foglia: grado di resistenza alla Plasmopara - 9) da elevato a molto elevato

453 - Grappolo: grado di resistenza alla Plasmopara - 7/9) da elevato a molto elevato

455 - Foglia: grado di resistenza all'Oidio - 1) molto debole

456 - Grappolo: grado di resistenza all'Oidio - 3) debole

458 - Foglia: grado di resistenza alla Botrytis - 5/7) da medio ad alto

459 - Grappolo: grado di resistenza alla Botrytis - 5/9) da medio ad alto

2.4. Utilizzazione

Per la vinificazione.

3. COLTIVAZIONE

3.1 Classificazione

3.1.1. In osservazione

In tutta la regione: Lombardia

Nella provincia di: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,
Venezia, Verona, Vicenza

3.2 DOP ed IGP

La varietà è ammessa nelle seguenti denominazioni di
origine e/o indicazioni geografiche.

4. PRODUZIONE VIVAISTICA

Di seguito sono riportate le produzioni di barbatelle innestate, divise per categoria di materiale, dal 2008 all'ultimo dato disponibile.

Anno	Standard	Certificato	Base	Iniziale *
2016	10.130	19.485	-	-
2014	-	14.943	450	-
2013	-	4.040	-	-

* : la categoria "Iniziale" è stata introdotta nel 2005

3.2.1. IGT

Alto Livenza, Colli Trevigiani, Conselvano, Trevenezie, Marca
Trevigiana, Alpi Retiche*, Vallagarina, Veneto*, Veneto Orientale,
Verona o Provincia di Verona o Veronese, Vigneti delle Dolomiti
(in lingua tedesca Weinberg Dolomiten)*

* è ammessa la menzione di questa varietà in etichetta